

	Креон 10000 Ферментный препарат из поджелудочной железы свиней и крупного рогатого скота	Мезим Ферментный препарат из поджелудочной железы свиней и крупного рогатого скота	FMD Основные Ферменты пищеварения 100% растительные из микроскопических грибов (см. таблицу ниже)	Что означают единицы измерения на упаковке Для Ферментов пищеварения FMD используются единицы FCC (Кодекса химического состава продуктов питания); этим подтверждается то, что энзимы прошли тщательную проверку активности и эффективности. Такие единицы могут быть разными для различных энзимов, поскольку для различных энзимов необходимы разные методы проверки эффективности. Этикетки других производителей не дают никакой информации в отношении силы действия или активности энзима.
Состав	Панкреатин 150 мг: амилаза 8000 ЕД ЕФ липаза 10000 ЕД ЕФ протеазы 600 ЕД ЕФ	Панкреатин: Амилаза 3500 ЕД Ph.Eur Липаза 4200 ЕД Ph.Eur Протеазы 250 ЕД Ph.Eur	Альфа-Амилаза.....5 000 FCC DU (62,5мг) Лактаза.....3 000 FCC ALU (37,5мг) Альфа-галактозидаза...260 FCC GalU (29,9 мг) Протеаза 4.5.....12 500 FCC HUT (25мг) Целлюлаза.....400 FCC CU (11,5мг) Липаза.....50 FCC LU (8.6мг) Stem бромелайн.....50 000 FCC PU (1.7мг)	
Капсулы	Желатиновые. При регулярном и длительном приеме вредны для желудка.	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой розового цвета (не уточняется из чего)	Растительные – 100% растворяются в желудке, абсолютно безвредные.	
Передозировка	Гиперурикурия - повышенное содержание мочевой кислоты в крови	Гиперурикурия - повышенное содержание мочевой кислоты в крови	Нет	
Побочные	Аллергические реакции - диарея, запор, ощущения дискомфорта в области желудка, тошнота	Аллергические реакции - диарея, запор, ощущения дискомфорта в области желудка, тошнота	Нет	
Противопоказания	Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; острый панкреатит; обострение хронического панкреатита	Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; острый панкреатит; обострение хронического панкреатита	Нет	
Ограничения	Не рекомендуется для длительного (регулярного приема). Вызывает привыкание.	Не рекомендуется для длительного (регулярного приема). Вызывает привыкание.	Рекомендованы для регулярного приема, т.к. не вызывают привыкания. В отличии от панкреатиновых, работают и в желудке и в кишечнике.	

Панкреатин (из Википедии) - выпускается под разными торговыми наименованиями:

«Биофесталь», «Нормоэнзим», «Ферестал», «Фестал», «Энзистал», Панкреофлат», «Биозим», «Вестал», «Гастенорм», «Креон», «Мезим», «Микразим», «Панзим», «Панзинорм», «Панкреазим», «Панкрелипаза», «Панкреноорм», «Панцитрат», «Пензитал», «Уни-Фестал», «Энзибене», «Эрмиталь», «Эвэнзим»

Фактически, все панкреатиновые препараты отличаются друг от друга только процентным соотношением Амилазы, Липазы и Протеазы.